

Objectif 3 : Santé et bien-être

Cible ONU 3.5 – Renforcer la prévention et le traitement de l'abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d'alcool.

Indicateur 3.i5 : Consommation d'alcool

Concepts et définitions

Définition

Proportion de personnes parmi la population de 18 à 75 ans, répartie selon différents modes de consommation d'alcool

Champ

France métropolitaine, population des 18-75 ans.

Commentaires

Cet indicateur permet de suivre la proportion de personnes visés par la cible concernant l'abus d'alcool et donc l'efficacité de sa mise en œuvre.

Cet indicateur ne peut être rattaché à un indicateur onusien car trop dissimilaire, mais il peut être rattaché à la cible ONU 3.5.

Méthodologie

Méthode de calcul

Le calcul de l'indicateur repose sur les réponses obtenues aux questions suivantes, incluant les trois premières questions de l'*Alcohol Use Disorder Identification Test* (AUDIT) :

- « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous bu du vin, de la bière, des alcools forts, d'autres alcools comme du cidre, champagne, porto... ? » Tous les jours / 4 à 6 fois par semaine / 2 ou 3 fois par semaine / 1 fois par semaine / 2 ou 3 fois par mois / 1 fois par mois ou moins souvent / Jamais.
- « Les jours où vous buvez, combien de verres de boissons alcoolisées buvez-vous dans la journée, que ce soit de la bière, du vin ou tout autre type d'alcool ? »
- « À quelle fréquence vous arrive-t-il de boire six verres de boissons alcoolisées ou plus en une même occasion ? Jamais / Moins d'une fois par mois / Une fois par mois / Une fois par semaine / Tous les jours ou presque.
- « Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été ivre ? »

La classification des buveurs qui en résulte comporte cinq niveaux pour cet indicateur :

- les individus ayant consommé de l'alcool au moins une fois dans l'année ;

- les individus ayant consommé de l'alcool tous les jours ;
- les individus ayant au moins une alcoolisation ponctuelle importante (API) (épisode de consommation d'au moins six verres en une occasion) au cours des 12 derniers mois ;
- les individus ayant au moins une ivresse au cours des 12 derniers mois ;
- les individus ayant au moins dix ivresses au cours des 12 derniers mois.

Désagréations retenues

Aucune.

Désagréations territoriales

Il est possible de calculer des données régionales.

Source des données

Description

Les données sont issues du [Baromètre Santé](#), volet Alcool.

Champ de l'opération

- Champ géographique : France métropolitaine.
- Population statistique : population générale âgée de 15 à 85 ans en 2010, de 15 à 75 ans depuis 2014 et de 18 à 75 ans en 2017. Les séries sont refaites sur les mêmes tranches d'âge a posteriori.

Périodicité

Variable.

Commentaires (ex. comparabilité dans le temps et dans l'espace)

Le questionnaire est partiellement modifié chaque année en fonction des centres d'intérêt définis à chaque renouvellement de l'enquête, mais un noyau dur de questions reste permanent à des fins comparatives.

Références / Publications

- « [Consommation d'alcool : part d'adultes dépassant les repères de consommation à moindre risque à partir des données du Baromètre de Santé publique France 2021](#) », Santé publique France, janvier 2023.
- « [Consommation d'alcool, comportements et conséquences pour la santé](#) », Santé publique France, février 2019.